

JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa incentivar os adolescentes a tomar a vacina contra o vírus HPV, uma vez que ainda há uma resistência à vacinação contra esse vírus, principalmente pela falta de informação. A vacina é segura e importante para o futuro dos jovens.



A disponibilização da vacina HPV em unidades de vacinação do município de Juiz de Fora, tem se mostrado ineficaz com relação a cobertura, trazendo com isso baixas coberturas vacinais o que aumenta em muito o risco dessas doenças, principalmente o câncer de colo de útero na mulher jovem com alto índice de mortalidade e elevados custos para a administração pública, danos esses que podem ser minorados simplesmente com a vacina na faixa etária discriminada pelos mecanismos de controle dessa doença.

O HPV é a infecção sexualmente transmissível (IST) mais frequente no mundo.

A vacinação o objetivo prevenir meninos e meninas dos cânceres de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus, boca e orofaringe

O vírus HPV é a principal causa do câncer do colo de útero, o terceiro tipo mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de mama e de cólon e reto. Com a disponibilização da vacina nas escolas da rede pública, espera-se a redução da incidência e da mortalidade por esta doença grave, que se caracteriza pelo crescimento anormal de células do colo do útero. Cerca de metade das mulheres diagnosticadas com câncer de colo do útero tem entre 35 e 55 anos de idade. Muitas provavelmente foram expostas ao HPV na adolescência ou na faixa dos 20 anos de idade.

HPV para meninos

O esquema vacinal para os meninos contra HPV é de duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. O objetivo é proteger contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa-etária para a vacinação visa proteger as crianças antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus.

HPV para meninas

Nas meninas, também em duas doses, o principal foco da vacinação é proteger contra o câncer de colo do útero, vulva, vaginal e anal; lesões pré-cancerosas; verrugas genitais e infecções causadas pelo vírus. O HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto.

Por estas razões que apresento aos meus pares o presente projeto.

Palácio Barbosa Lima, 09 de agosto de 2021.



Antônio Santos de Aguiar
Vereador Dr. Antônio Aguiar - DEM